

XLVI.—*Description des trois Espèces nouvelles d'Oiseaux du Pérou du Muséum Branicki.* Par le Comte HANS VON BERLEPSCH et JEAN STOLZMANN.

(Plate XV.)

1. *CHLOROCHRYSA HEDWIGÆ*, sp. n. (Plate XV.)

Splendide gramineo-viridis, dorso inferiore obscure glauco-viridi, fascia uropygii e plumis rigidis saturate aurantiorubra, fascicula magna e plumis brevibus et rigidis ad latera colli corallino-rubra; gula, pectore plagaque hinc inde abdominis medii pulchre violaceo-cyaneis, macula exigua pilei medii pallide stramineo-flava; rostro pedibusque nigris. Long. alæ 72·5, caudæ 46·5, tarsi 19·5 mill.

Obs. A *C. calliparæa* et *C. bourcierii* fascicula e plumis rigidis ad latera colli magna pulchre corallino-rubra nec aurantio-brunnea, nec non gula, pectore, abdomineque medio violaceo-cyaneis (nec gula nigra, nec pectore viridi) primo visu distinguenda.

Hab. in Peruvia orientali-meridionali: circum Huaynapata, regionis Marcapata.

Nous nous permettons de dédier cette belle espèce, qui est très distincte des espèces connues du genre *Chlorochrysa*, à Mme. la Comtesse Hedwige Branicka, mère de Xavier Branicki.

La *C. hedwigæ* se distingue au premier coup d'œil de la *C. calliparæa* et de la *C. bourcierii* par la présence de deux très grands fascicules très étendus de plumes rigides sur chaque côté du col inférieur, qui sont d'un rouge de corail au lieu d'un brun doré. Ces fascicules sont situés aux côtés de la base du col, tandis que chez les autres espèces ils couvrent une partie des côtés de la tête. La couleur et la structure des plumes de ces fascicules rappelle celles des plumes au col supérieur de la *Calliste festiva* du Brésil.

La gorge, la poitrine, ainsi qu'une bande s'étendant le long du milieu de l'abdomen, sont d'un bleu violacé vif ou couleur d'outremer, tandis que chez les autres espèces la gorge est noire et le haut de la poitrine est d'un vert bleuâtre à son milieu.



J.G. Keulemans del et lith.

Mintern Bros. imp.

CHLOROCHRYSA HEDWIGÆ, ♂, ♀.

Le rouge du croupion est couleur de feu plus clair que celui des fascicules du col, mais plus vif et moins orangé que sur le croupion des autres espèces.

La tache jaunâtre du pileum est plus petite et beaucoup plus pâle, d'un jaune paille au lieu d'un jaune orangé.

Le bleu verdâtre du dos inférieur est beaucoup plus foncé.

Les tectrices sus-caudales les plus longues, les sous-caudales, les côtés de la tête et le front sont d'un vert pré pur au lieu d'un vert bleuâtre.

M. Jean Kalinowski a envoyé onze individus de cette superbe espèce.

2. PHLOGOPHILUS HARTERTI, sp. n.

Affinis *P. hemileucuro*, sed multo minor, corpore subtus rufescenti-albo, gula corporisque lateribus rufescentioribus, pectore abdomineque medio albescentioribus; rectricibus—duabus mediis viridibus exceptis—albis vitta lata anteapicali obliqua æneo-nigra transfasciatis, apicibus rufescente tinctis; corpore supra obscure cyanescenti-viridi, rectricibus duabus mediis glaucoviridibus apicibus nigricantibus; rostro gracili nigro, mandibula dimidio basali brunnescente. Long. alæ 45, caudæ 26.5 mill.

Obs. A *P. hemileucuro* crassitie multo minore, corpore subtus rufescente, gulæ maculis indistinctis rufescentibus nec definitis viridibus, necnon pictura caudæ distinguendus.

Hab. Circum Huaynapata, regionis Marepata, Peruviae meridionalis-orientalis.

La femelle unique recueillie par M. Kalinowski appartient sans doute à une nouvelle espèce du genre *Phlogophilus* fort différente du *P. hemileucurus*. Peut-être que le mâle, si nous le connaissions, serait encore plus distinct par des détails de coloration.

L'espèce que nous venons de décrire et que nous dédions à Monsieur Ernst Hartert de Tring, à qui nous devons une monographie excellente des Trochilidés, est beaucoup plus petite que le *P. hemileucurus*.

Les parties inférieures du corps sont d'une teinte roussâtre pâle plus vive sur la gorge, coupée de certaines taches roussâtres peu marquées, il en est de même aux côtés du

corps. La poitrine et le milieu du ventre sont blanchâtres, fondues d'une teinte roussâtre. Il y a de petites taches verdâtres peu marquées aux côtés de la gorge (région mystacale et sous-auriculaire) tandis que chez le *P. hemileucurus* il y a de grandes taches bien marquées d'un vert à reflets métalliques sur toute la gorge et une large bande verte interrompue au milieu sur la poitrine. Le reste des parties inférieures du corps chez le *P. hemileucurus* est d'un blanc pur.

Les parties supérieures du corps sont d'un vert légèrement plus foncé un peu plus bleuâtre que chez le *P. hemileucurus*. La coloration des rectrices externes diffère un peu : La bande d'un bleu d'acier qui se manifeste sur toutes les rectrices, sauf les deux médianes, est beaucoup plus étroite, plus oblique et placée à l'extrémité de la plume. Par conséquent la partie basale blanche est plus étendue se prolongeant jusque vers la moitié de la plume. Les extrémités blanches sont un peu plus courtes et peintes de roux, ce qui n'est pas le cas chez l'autre espèce.

3. SIPTORNIS PUNENSIS, sp. nov.

Affinis *S. graminicolæ*, sed differt rectricibus tribus utrinque externis in dimidio basali (vel maxima ex parte) nigris, parte apicali solummodo rufo-brunneis, nec unicoloribus rufo-brunneis; remigibus primariis in dimidio basali pogonii externi obscurius rufo-brunneis. Long. alæ 76, caudæ 92.5, tarsi 21.5 mill.

Hab. Circum Puno, Peruvix meridionalis-orientalis (alt. 12,600 pedum).

M. Kalinowski a recueilli un mâle et trois femelles à Puno les 13 et 15 avril et le 15 juin, 1896.

Cette forme nouvelle est presque intermédiaire entre la *S. graminicola* Sel. de Junin * et la *S. anthoides* du Chili. Elle ne diffère de la première que par la coloration des trois paires de rectrices externes qui sont noirâtres, à bouts d'un roux-brunâtre.

La teinte noire de la base des rectrices s'étend de plus en plus des externes à la troisième, tandis que les extrémités

* Berlepsch en a reçu des individus recueillis par M. O. Garlepp aux environs de Cauramarca près de Cuzco.

roux-brunâtres deviennent de plus en plus courtes dans la même direction.

La partie basale des barbes externes des rémiges primaires est d'un roux-brun plus sombre ou moins clair que chez la *S. graminicola*. Chez cette dernière les trois paires de rectrices externes sont d'un roux-brun ou canelle uniforme jusqu'à la base. Seules les tiges et une bordure étroite sur chaque barbe de la troisième rectrice sont noirâtres. La quatrième rectrice présente une large bande d'un roux-brun sur la barbe interne, ce qui n'est pas le cas chez la *S. punensis*. Il paraît aussi que la *S. punensis* aurait des dimensions un peu plus fortes.

Chez la *S. anthoides* le dessin des rectrices externes est presque comme chez la *S. punensis*, mais les extrémités sont d'un roux plus clair. La *S. anthoides* se distingue aussi par la strie sourcilière et le milieu de l'abdomen, qui sont blanchâtres au lieu d'être roussâtres, etc.

XLVII.—Notices of recent Ornithological Publications.

[Continued from p. 515.]

116. 'Annals of Scottish Natural History.'

[The Annals of Scottish Natural History. No. 37, January 1901; and No. 38, April 1901.]

Messrs. W. Eagle Clarke and T. G. Laidlaw open the year with some valuable notes on the migratory birds which visit Southern Shetland in autumn; and Mr. William Evans gives us the result of his investigations during the last two seasons on *Motacilla alba* in the Forth area. Some remarks by Saunders on the Great Shearwater (*Puffinus gravis*) are intended to call attention to the observations of Capt. Collins in the Bay of Fundy, which appear to have been overlooked. To the April number, Mr. Laidlaw contributes the first instalment of his Report on the movements and occurrences of birds in Scotland during 1900; and it is clearly shown that the interest taken by keepers at light-